

# 高频易错考点|药二（1）

2016-09-07 药师在线



## 高频易错考点来了



9月来了，清爽的秋日，天高云淡。本应靓丽的好心情却随着药考的逼近也逐渐紧张起来。

距离考试还有37天，每一个奋战在药考战场的朋友们，我们除了每日一练外又推出一个全新的板块，高频易错考点，在最后的冲刺阶段为您查缺补漏，执考路上我们与您相伴，祝您遇题必会，逢考必过！

所有内容出自中国医药出版社出版的《2016 国家执业药师考试·高频易错考点随身记·》如果我们的更新无法满足您的进度，欢迎各位亲们自行查阅或购买实体书哟！

欢迎大家留言！

### 药二 第一节

第一章

精神与中枢神经系统疾病用药

第一节 镇静与催眠药

考点1 药理作用与临床评价

1. 作用特点、典型不良反应、禁忌证

| 分类及代表药                     | 作用特点                                                 | 典型不良反应                                          | 禁忌证                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 巴比妥类<br>(苯巴比妥)             | 一般剂量：镇静、催眠；<br>中等剂量：麻醉；大剂量：<br>昏迷，甚至死亡               | 后遗效应、 <u>依赖性</u> 、 <u>成瘾性</u> 、 <u>致死性剥脱性皮炎</u> | 严重肺功能不全、肝硬化、贫血、未被控制的糖尿病、过敏者             |
| <u>苯二氮草类</u><br>(地西洋、艾司唑仑) | <u>激动苯二氮草受体。镇静催眠，中枢性肌松，抗焦虑。大剂量不引起麻醉</u>              | <u>嗜睡、依赖性、步履蹒跚、撤药症状</u>                         | 过敏者、妊娠期妇女、新生儿。呼吸抑制、呼吸无力、严重肝损害者禁用硝西洋、氟西洋 |
| 其他类<br>(佐匹克隆、唑吡坦)          | 佐匹克隆，艾司佐匹克隆：镇静催眠、抗焦虑、肌肉松弛和抗惊厥等。 <u>唑吡坦，仅具有镇静催眠作用</u> | <u>精神紊乱</u>                                     | 严重呼吸功能不全、睡眠呼吸暂停综合征、严重及急慢性肝功能不全、肌无力及过敏者  |

2. 药物相互作用

(1) 巴比妥类 肝药酶诱导剂，长期用药加速自身代谢，加速其他经肝药酶代谢的药物的代谢。使疗效降低。

(2) 苯二氮草类 与易成瘾和其他可能成瘾药物合用，成瘾危险性增加；增强抗高血压药或利尿降压药的降压效果；与钙通道阻滞剂合用，加重体位性低血压；与普萘洛尔合用，可致癫痫发作类型或频率改变。

(3) 其他类 唑吡坦：延长氯丙嗪的药效；与丙米嗪合用可增加嗜睡反应和逆行遗忘的发生。佐匹克隆：与肌松药或其他中枢神经抑制剂合用可增强镇静作用；与苯二氮草类抗焦虑药或催眠药合用，可增加戒断症状的出现。

 易错题解析

1. 多项选择题：下列属于苯二氮草类药物的是

- A. 帕罗西汀
- B. 氟西洋
- C. 奥沙西洋
- D. 佐匹克隆
- E. 艾司唑仑

[答案与解析] BCE。帕罗西汀：5-HT再摄取抑制剂（抗抑郁药）；氟西洋、奥沙西洋、艾司唑仑：苯二氮革类；佐匹克隆：环吡咯酮类。因此应选择BCE。

2. 多项选择题：下面属于苯二氮革类药物具有的优点是

- A. 成瘾性小
- B. 仅具有镇静催眠作用
- C. 无肝药酶诱导作用
- D. 突然停药无反跳现象
- E. 大剂量不会引起麻醉

[答案与解析] ACE。苯二氮革类与巴比妥类相比成瘾性小；除有镇静催眠作用外，还有抗焦虑、抗惊厥、抗癫痫等作用；无肝药酶诱导作用；突然停药后可产生撤药症状；大剂量不会引起麻醉。因此应选择ACE。

一般苯二氮革类与巴比妥类相比较的突出特点是苯二氮革类大剂量不引起麻醉。

药二

考点2 用药监护

1. 依据睡眠状态选择用药

| 睡眠状态              | 选药          | 注释                      |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 入睡困难              | 首选艾司唑仑或扎来普隆 | 起效快，醒后无不适感              |
| 焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者  | 氟西洋或三唑仑     |                         |
| 睡眠时间短且夜间易醒早醒者     | 夸西洋         |                         |
| 老年失眠者             | 10% 水合氯醛糖浆  | 起效快，无蓄积，醒后无宿醉           |
| 改善入睡难和夜间觉醒或早间觉醒过早 | 唑吡坦、艾司佐匹克隆  | 不良反应少，尤其无镇静和宿醉现象，临床优势明显 |

## 2. 注意用药的安全性

①交替使用，尽量避免长期使用一种药。②服用后避免驾车、操纵机器和高空作业。③在服药期间不宜饮酒。

## 3. 关注巴比妥类的合理应用

①确定是否对该类药物过敏，一旦出现皮疹等，应立即停药。②静脉注射巴比妥类药，特别是快速给药时，容易出现呼吸抑制。应严格控制静脉给药剂量。③作为抗惊厥药使用时，应定期监测血浆药物浓度。

## 4. 关注老年人对苯二氮草类的敏感性和“宿醉”现象

①老年人静脉注射更易出现呼吸抑制、低血压、心动过缓甚至心跳停止。②服用后，可产生过度镇静、肌肉松弛作用，觉醒后可发生震颤、思维迟缓、步履蹒跚、肌无力等“宿醉”现象，极易跌倒和受伤。须告之患者晨起时小心，避免跌倒。

### 真题回放

1. 最佳选择题：与青年人相比，老年人应用后敏感性增高易引起“晨起跌倒”，的药物是（2014）

- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| A. 美洛西林 | B. 地西洋  | C. 沙美特罗 |
| D. 克伦特罗 | E. 罗红霉素 |         |

[答案] B

2. 最佳选择题：老年人对苯二氮草类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为（2015）

- |            |          |
|------------|----------|
| A. 震颤麻痹综合征 | B. 老年期痴呆 |
| C. “宿醉”现象  | D. 戒断综合征 |
| E. 锥体外系反应  |          |

[答案] C



### 易错题解析

最佳选择题：适合老年人使用，起效快，无蓄积，醒后无宿醉的催眠药是

- |        |         |         |
|--------|---------|---------|
| A. 地西洋 | B. 唑吡坦  | C. 苯巴比妥 |
| D. 三唑仑 | E. 水合氯醛 |         |

[答案与解析] E。地西洋、苯巴比妥、三唑仑均有宿醉现象。水合氯醛起效快，无蓄积，醒后无宿醉，适合老年人使用。所以选 E。

唑吡坦虽无明显宿醉，但老年患者服用易出现共济失调、精神紊乱。



药学6群

397756166

中药6群

485474508



药师在线官方微博



投稿及合作

QQ: 3385616718

联系邮箱:

iyaoshimedia@163.com

长按二维码识别并关注药师在线